



## Nouvelles de la clinique

Cet été, nous avons dû faire face à une épidémie virale très contagieuse chez les chats à Lavaur.

Nous vous encourageons à lire l'article sur la vaccination ci-dessous et vous incitons à être à jour avec vos vaccins, car il y a eu une recrudescence de la **calicivirose** et du **typhus**, pathologies que l'on croit généralement peu fréquentes.



Il existe en outre une forme hyper virulente de la calicivirose se caractérisant par une fièvre très importante, un gonflement de la face importante, des ulcères et des croûtes sur le nez, les lèvres, les oreilles, les yeux et les coussinets. On observe parfois de grandes difficultés respiratoires et une atteinte rénale. L'affection étant très contagieuse, l'isolement et une hygiène draconienne sont indispensables pour éviter les risques de transmission.

## Horaires d'ouverture

### Consultations sur rendez-vous

Lundi - vendredi : 9h<sup>00</sup> - 12h<sup>00</sup>  
Samedi : 9h<sup>00</sup> - 13h<sup>00</sup>

### Consultations libres

Lundi - vendredi : 14h<sup>00</sup> - 19h<sup>00</sup>

Tél : 05 63 58 39 70

Email : veterinaire.saintroch@gmail.com

## Bilan senior : il est vieux, je m'en occupe mieux

Votre chien a plus de 7 ans ou votre chat a plus de 9 ans, il vient d'entrer dans la catégorie « senior ». Il vous paraît être en pleine forme pour son âge et ne présente en apparence aucun symptôme. C'est peut-être le moment pour réaliser un bilan de santé approfondi comme c'est déjà le cas en médecine humaine.

### Un bilan senior : pourquoi faire ?

Le processus naturel qu'est le vieillissement rend votre animal plus sensible à certaines pathologies qui vont apparaître insidieusement. Par exemple, les symptômes de l'insuffisance rénale, maladie fréquente de l'animal âgé, n'apparaissent que lorsque 75% des reins sont touchés de façon irréversible. Il est donc important de la détecter le plus précocement possible, avant l'apparition des symptômes, afin de mettre en place un traitement simple et efficace dès ce stade et ainsi ralentir sa progression. Ces mesures permettront d'augmenter l'espérance de vie et d'améliorer la qualité de vie de votre compagnon.

Pour toutes ces raisons, nous avons mis au point un bilan senior préventif. Il permet de dépister certaines maladies des reins, du foie, du sang (anémies, infections), du pancréas (diabète...) et de la thyroïde.

### En quoi consiste ce bilan senior ?

Ce bilan peut être effectué lors du rappel vaccinal annuel. Nous procédons tout d'abord à la réalisation d'un examen médical approfondi, un entretien « santé » complet et un prélèvement sanguin. Nous vous expliquons ensuite l'ensemble des résultats, vous donnons des conseils adaptés et répondons à toutes vos questions.



## Animal vacciné = animal protégé

Tout au long de sa vie, votre compagnon peut attraper des maladies contagieuses pouvant affecter gravement sa santé, voire même être fatales. Certaines de ces maladies sont également transmissibles à l'homme, comme c'est le cas de la leptospirose et de la rage.

Pour prévenir ces affections graves, la vaccination est la seule vraie protection.

Les premières vaccinations interviennent très tôt dans la vie de l'animal. En effet, vers l'âge de 2 mois, les chiots et les chatons ne sont plus protégés par les anticorps de leur mère et de ce fait, ils sont particulièrement exposés aux maladies. C'est donc à cet âge qu'il convient de procéder à la première injection, suivie d'un premier rappel un mois plus tard.

Par la suite, sachez que la majorité des vaccins exigent un rappel annuel. De plus, les défenses immunitaires de votre ami à quatre pattes baissent avec l'âge. Ne négligez donc pas ses vaccins même s'il est vieux ! Une vaccination régulière nous permet également d'examiner votre protégé sous toutes ses coutures et de déceler précocement d'éventuels problèmes de santé.

De nombreux vaccins sont disponibles pour les maux de compagnie. Certains d'entre eux ne sont pas systématiquement administrés. N'hésitez donc pas à nous questionner à ce sujet afin que nous puissions vous conseiller le protocole le plus adapté.



## Les glandes anales

Votre compagnon se lèche-t-il frénétiquement le derrière ou fait-il « le traîneau » ? Si le problème persiste malgré une vermifugation adaptée, venez donc nous voir, afin que nous puissions examiner ses glandes anales et le soulager si nécessaire.




### Où se situent donc ces glandes et à quoi servent-elles ?

Les chiens sont dotés de deux petits sacs de part et d'autre de l'anus, les glandes anales. Ces dernières produisent un liquide (affleurement nauséabond) qui sera éliminé petit à petit par deux canaux excréteurs qui se situent de part et d'autre de l'anus. Les glandes se vident donc en règle générale spontanément, lors du passage des selles dans l'anus quand le chien défèque, ou brutalement lors d'un stress. Leur fonction est principalement de marquer le territoire.

### Problème de vidange

Il arrive que les glandes anales ne se vident pas correctement, ce qui produit une gêne pour le chien. Les chiens tentent alors de se soulager en frottant leur derrière par terre. Certaines races de chien sont prédisposées à ce type de problème. L'accumulation de sécrétions peut aboutir à la formation d'infections et d'abcès qui induisent de la douleur et de la fièvre. Certains animaux souffrent de cette affection de manière chronique et ont besoin d'une surveillance et d'une vidange préventive régulière de leurs glandes anales.



### Quelle est donc la solution ?

Dans la plupart des cas une simple vidange suffira à soulager les symptômes. En cas d'infection, un traitement antibiotique adapté sera prescrit à votre protégé. Pour les abcès, il est nécessaire de procéder à un curetage, généralement pratiqué sous anesthésie générale.

## Les vers intestinaux - un problème caché

Si les vers sont nuisibles pour la santé, ils sont toutefois rarement détectables, car les symptômes associés sont souvent discrets. De plus, seul les oeufs (microscopiques) passent dans les selles, et sont donc difficiles à visualiser. Ils représentent néanmoins un risque pour votre protégé et son environnement proche, surtout les enfants.



Les vers peuvent être classés en deux grandes catégories : les vers ronds et les vers plats ou ténias.

**Les ascaris**, vers ronds « spaghetti » de 10 cm de long environ, contaminent essentiellement les chiots et les chatons. Ils provoquent des diarrhées, des ballonnements, des retards de croissance, et une baisse de l'immunité.

**Les ankylostomes** sont des vers dangereux mais plus rares. Ils provoquent fièvre et problèmes digestifs (diarrhées avec parfois présence de sang).

**Les Trichures** sont les vers les plus fréquents chez le chien adulte. Les trichures adultes s'enkystent dans le gros intestin. Les oeufs peuvent résister à l'extérieur plusieurs années.

Le plus répandu des ténias est le **Dipylidium**. On peut le voir quand ses derniers segments remplis d'oeufs sont éliminés dans les selles (« grains de riz »). Il provoque des carences alimentaires et des irritations, l'animal se frotte le derrière par terre.

La vermifugation doit être considérée comme un geste de santé publique. Il est conseillé de vermifuger les jeunes animaux tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois et les animaux adultes tous les 3 mois. Laissez-nous vous conseiller sur le vermifuge le plus adapté à votre compagnon.



## L'insuffisance rénale - mon chat est-il à risque, Docteur ?

Que veut dire l'expression « insuffisance rénale chronique » ?

Il s'agit de l'incapacité des reins à éliminer les déchets du sang et non une incapacité à produire de l'urine. En effet, la plupart des chats souffrant de ce type d'insuffisance rénale produisent plus d'urine, mais les déchets ne sont pas suffisamment éliminés.

### Quand cela est-il susceptible d'arriver à mon chat ?

La forme typique de l'insuffisance rénale est le résultat du vieillissement ; c'est simplement un processus « d'usure ». Chez la plupart des chats les premiers signes apparaissent entre 10 et 14 ans.

### Quels sont les symptômes ?

Afin de ne pas se déshydrater, à cause de la perte de liquide dans l'urine, le chat verra sa soif augmenter donc il tentera de boire plus. A un stade plus avancé, on observera une perte d'appétit, de la dépression, des vomissements, de la diarrhée et une très mauvaise haleine.

### Comment diagnostique-t-on cette maladie et y a-t-il des traitements ?

Une simple prise de sang permet de doser le niveau de deux déchets organiques : l'urée et la créatinine. Une analyse d'urine permet de compléter l'étude de la fonction rénale.

Le traitement s'effectue en deux phases. La première consiste à faire « repartir » les reins. Pour ce faire, on injecte de grandes quantités de liquides intraveineux pour « laver » les reins. La deuxième phase du traitement consiste à maintenir les reins fonctionnels le plus longtemps possible. Ceci se fait en donnant à votre chat une diète faible en protéines et en administrant divers médicaments.

Le pronostic est très variable et dépend de la réponse au traitement effectué pendant la phase initiale. Toutefois, nous encourageons à traiter dans la plupart des cas, car les chats répondent généralement bien au traitement. Leur vie s'en retrouve prolongée de plusieurs années, dans de bonnes conditions.

