



## MEILLEURS VOEUX

Toute l'équipe de la clinique en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2013 !



## Horaires d'ouverture

### Consultations sur rendez-vous

Lundi - vendredi : 9h<sup>00</sup> - 12h<sup>00</sup>  
Samedi : 9h<sup>00</sup> - 13h<sup>00</sup>

### Consultations libres

Lundi - vendredi : 14h<sup>00</sup> - 19h<sup>00</sup>

**Tél : 05 63 58 39 70**

Email : [veterinaire.saintroch@gmail.com](mailto:veterinaire.saintroch@gmail.com)

## Les coulisses de la clinique

L'entretien et le ravalement de façade sont maintenant terminés. Nous vous remercions pour votre patience pendant les travaux.



## Le pense-bête de l'hiver

**Antigel** : Veillez à ce que votre petit compagnon n'ait pas accès à des flaques, car c'est une substance au goût sucré donc attrayant, mais très toxique pour les reins si ingéré.

**Arthrose** : Le froid et l'humidité peuvent renforcer les symptômes d'arthrose. Si votre compagnon a du mal à se lever ou tourne en rond longtemps avant de se coucher, pensez à nous en parler. Des solutions existent pour le soulager.

**Fêtes de fin d'année** : Carcasses de poulet, décorations... autant de choses qui peuvent provoquer obstructions, voire perforations intestinales si ingérées !

**Chocolat** : N'oubliez pas que c'est une substance hautement toxique pour les carnivores domestiques et qu'il peut provoquer des troubles cardiaques graves.

**Promenades** : Maintenez ses promenades, même si le temps s'y prête beaucoup moins en hiver.

Votre toutou vous remerciera et s'en portera mieux.

**Puces** : Continuez à les protéger avec des pipettes ou des comprimés contre les puces, car elles continuent à se multiplier, bien au chaud, dans nos maisons !

**Feux ouverts** : Surveillez vos animaux.



## Grossesse nerveuse - comment la gérer au mieux

La « grossesse nerveuse » est un état physiologique (donc non pathologique) qui apparaît chez la chienne non gestante dans les semaines qui suivent les chaleurs. Votre toutou atteinte d'une grossesse nerveuse va manifester les mêmes symptômes que lors d'une mise bas : comportement maternel envers certains objets, construction d'un nid, agitation (et parfois agressivité), troubles de l'appétit, gonflement des mamelles avec ou sans production de lait. Il ne faut cependant pas confondre cet état avec un désir de mater. Il s'agit plutôt d'un bouleversement hormonal entraîné par l'ovulation.

La grossesse nerveuse a également une **signification comportementale dans une meute sauvage**. En effet, celle-ci est structurée afin que seul le couple dominant puisse se reproduire. Quand

les femelles qui occupent une position inférieure font une montée de lait, elles peuvent aider celle qui vient d'accoucher à nourrir ses petits.

Cet état doit néanmoins être pris en charge chez la chienne domestique, en raison notamment de l'agressivité potentielle de la femelle ainsi que des complications possibles (infections mammaires, prédispositions aux tumeurs mammaires).

**Que faut-il faire ?** Un traitement hormonal fera chuter les hormones responsables du problème. Un traitement local astringent (pommade) peut y être associé, ainsi qu'une diète hydrique de 48 heures. La confiscation des jouets et peluches est recommandée.

Pour prévenir les grossesses nerveuses, il faut prévenir les chaleurs par le biais d'une contraception ou d'une stérilisation chirurgicale.

## Pourquoi mon chien n'est-il pas propre ?

Le chien/chiot peut ne pas avoir appris la « propreté » selon nos règles. Il faut savoir qu'il n'est pas naturel pour un animal de se retenir pour éliminer à un autre moment, à un autre endroit. Un apprentissage long doit donc être mis en place.

### Malpropreté du chiot

Le chiot a une capacité très limitée à se retenir. Il faut donc le sortir régulièrement : après un repas, une sieste et un jeu. L'encourager verbalement et le féliciter lorsqu'il fait ses besoins



dehors aident à le rendre propre plus vite.

### Malpropreté liée au stress, aux émotions

Le chien peut aussi éliminer lors de situations stressantes. Cela arrive lorsque le chien ne supporte pas la solitude. Les éliminations peuvent être accompagnées de déplacements ou de destruction d'objets appartenant à son être d'attachement. D'autres chiens vont uriner de peur ou de stress tout près de leur propriétaire. La « joie » ou la peur peuvent aussi empêcher un chien de se contenir en présence des membres de la famille ou de visiteurs.

### Malpropreté résultat de son affirmation

Certaines éliminations ont pour but de communiquer, marquer le lieu de vie et affirmer sa position de leader. Elles sont caractérisées par des selles moulées et des urinations au milieu d'un lieu fortement fréquenté, de manière à les rendre bien visibles de tous. C'est le système relationnel proposé par leurs propriétaires, qui conduit ces chiens à produire ces comportements d'éliminations de communication (indésirables !). De là, s'impose une réorganisation parfois radicale des relations, avec des règles de vie claires.

### Malpropreté liée à une pathologie

Il existe aussi des pathologies affectant le système urinaire (comme la cystite, l'incontinence, le diabète). Il faut donc toujours s'assurer de la santé de son chien auprès de son vétérinaire.

## Grande campagne de dépistage Felv/FIV

### Votre chat présente-t-il un risque d'être infecté ?

Les contacts rapprochés ou les bagarres avec d'autres chats sont des situations à risque pendant lesquelles votre chat peut être contaminé par les virus FeLV ou FIV. Il peut suffire d'un unique contact pour que la transmission ait lieu. Les chats séropositifs peuvent ne présenter aucun signe pendant des mois, voire plusieurs années, ne développant des signes cliniques sévères que plus tard dans leur vie.

### Qu'est-ce que la Leucose (FeLV) ?

La leucose se traduit par l'apparition de tumeurs et/ou d'une immunodépression progressive (baisse des défenses immunitaires entraînant des infections). Des vaccins efficaces pour protéger votre chat de la leucose féline existent.

### Qu'est-ce que le Sida du chat (FIV) ?

Le sida du chat endommage le système immunitaire, rendant le chat plus fragile aux infections. Le FIV n'est pas transmissible à l'Homme ! Il n'existe malheureusement pas de vaccin protégeant les chats contre cette maladie.

### Le diagnostic précoce est essentiel

Les chats contaminés peuvent vivre de nombreuses années. La prise en charge vétérinaire

adéquate leur permettra de vivre en meilleure santé, plus longtemps et d'éviter de transmettre ces maladies.

Demandez-nous de tester votre chat dès aujourd'hui.

Le test ne nécessite que quelques gouttes de sang et le résultat est disponible après 10 minutes seulement.



### Dans quels cas réaliser le test :

- chat avec accès à l'extérieur
- blessures ou abcès
- contact avec d'autres chats
- adoption récente
- chat non stérilisé
- chat fatigué, perte de poids ou manque d'appétit
- mauvaise guérison de ses plaies ou abcès

## Aux petits soins pour ses griffes et coussinets !

Les coussinets des chiens et chats jouent entre autres un rôle **amortissant et isolant**. Ils sont mis à rude épreuve entre le passage d'une pièce surchauffée à une rue glaciale, et lors d'escapades aux sports d'hivers avec neige et sel de déneigement.

Au retour d'une promenade sur un sol sableux ou boueux, n'hésitez pas à **rincer à l'eau claire** les pattes de votre chien, de même qu'après une sortie en hiver, lorsqu'il gèle et que du sel de déneigement a été répandu sur le sol : ce sel provoque en effet des irritations. Chez les chiens à poil long, il faut **enlever régulièrement les bourres de poils** qui se logent entre les doigts.

Si votre chien est fragile des coussinets ou avant un départ à la montagne, pensez à appliquer dix à quinze jours avant le départ, une **solution tannante** afin d'épaissir ses coussinets tout en préservant leur souplesse. Graissez les

coussinets avec de la vaseline ou de la bafine avant de le faire marcher dans la neige.

Des **griffes trop longues** peuvent blesser les coussinets plantaires. Leur pousse exagérée résulte d'un manque d'exercice et/ou de mauvais aplombs. Elle est également fréquente chez l'animal âgé. Il faut alors les couper, sans oublier l'ergot. La griffe ne doit pas être coupée trop court, car cela est douloureux pour l'animal.