

Petits rappels

- Attention aux coups de chaleur. Ne laissez pas votre animal dans la voiture, même lorsqu'il fait couvert.
- Les puces prolifèrent vite en été. N'oubliez pas de traiter vos compagnons.
- Les épillets se fauillent partout. Contrôlez pattes et oreilles après chaque promenade.

Les coulisses de la clinique

Bonjour à Tous,

Voici l'été... en espérant que les beaux jours ensoleillés feront oublier ce printemps d'une météo bien maussade.

Le Docteur Bérengère WAMBERGUE est partie en congé maternité et reviendra début 2014. Nous lui souhaitons à elle et sa famille beaucoup de bonheur.

La Clinique Saint Roch reste ouverte durant les 2 mois des vacances d'été.

Bon été à Tous !

Docteurs Agnès et Nicolas MASURE



Les abcès chez le chat

L'été arrive, les jours s'allongent et sans doute avez-vous remarqué que votre chat sort plus. Malheureusement, ces sorties peuvent s'accompagner de **bagarres** entre congénères, car nos félins domestiques sont des animaux très territoriaux. **Gare aux blessures** provoquées par des morsures, souvent localisées au niveau lombaire, de la queue ou de la tête ! De petits points d'inoculation masquent en général une infection plus profonde et passent facilement inaperçus sous les poils. La bouche du chat contenant de nombreux germes, il n'est pas rare que ces blessures se transforment en **abcès**.

Le premier signe est souvent une perte d'appétit, une boiterie ou un gonflement localisé avec un animal **douloureux et fiévreux**. Ensuite le pus se collecte et l'abcès se forme en moins de 48 heures ! Le traitement consiste à drainer l'abcès sous anesthésie générale et à mettre en place un traitement antibiotique et antidouleur adapté.

La **stérilisation** est un moyen de prévention et permet de réduire la fréquence des bagarres liées à la période de reproduction.



Confis entre chats



les canines des chats sont assérées et provoquent de vilaines blessures



morsure de chat

La consultation pubertaire chez le chien

La **consultation pubertaire** est un rendez-vous **important** dans la vie de votre compagnon. Elle permet de faire le point sur le **stade de croissance**, l'**état dentaire**, le statut vaccinal et le **développement comportemental du chiot**. En effet, entre 3 et 15 mois, le chiot évolue énormément et il est préférable de le revoir avant le rappel annuel de vaccination qui a lieu vers 15 mois.

Cette visite permet également la mise en place d'une **prévention** des maladies et des infestations parasitaires personnalisée et adaptée à votre mode de vie.

De plus, elle nous donne l'occasion de discuter avec vous de l'**éducation** et du **comportement** du chiot.



Lors de problèmes de malpropreté par exemple, ou encore en cas de destructions, aboiements, désobéissance, etc, il est plus facile d'apporter des solutions et de rectifier ces comportements indésirables chez un chiot de 6 mois que chez un chien adulte.

Enfin, la consultation pubertaire est l'occasion de discuter de l'éventualité d'une stérilisation, souvent conseillée chez la chienne, la chatte et le chat.

Pour vous proposer cette consultation lorsque votre chiot arrivera à l'âge de la puberté (à partir de 6 mois), vous recevrez un courrier comme pour les rappels de vaccins.

Reconnaître la douleur chez le chien et le chat



La douleur est avant tout un signal d'alarme qui permet à l'organisme d'apporter une réponse adaptée par rapport à une agression (p.ex. retrait d'un membre lors d'une brûlure). Il s'agit donc d'un mécanisme utile et nécessaire à la préservation de l'organisme. Cependant, dès lors que ce mécanisme perdure au-delà de cette étape protectrice, la douleur devient pathologique et entraîne toute une série de complications.

Quelles sont les sources de douleur ?

Il a été démontré que les mécanismes qui génèrent la douleur sont remarquablement homogènes au sein des différentes espèces. Les affections qui sont considérées comme douloureuses pour l'homme le sont donc également pour l'animal: **blessures, abcès,**

fractures, chirurgie !

Il ne faut pas oublier que la douleur peut également présenter un caractère chronique, comme dans le cas de l'**arthrose** ou de certains **cancers**. Ces douleurs ne sont pas toujours clairement exprimées par des pleurs chez l'animal, mais il est impératif de ne pas les négliger.

Comment traiter la douleur ?

Les médicaments antalgiques doivent toujours être utilisés sous surveillance vétérinaire. Les deux grandes familles de molécules utilisées chez les carnivores domestiques sont les anti-inflammatoires non-stéroïdiens et les morphiniques. Attention, la plupart des antidouleurs utilisés chez l'homme ne conviennent pas à nos compagnons et certains peuvent même être fatals (notamment le paracétamol chez le chat). Il vaut donc mieux consulter plutôt que d'avoir recours à l'auto-médication.

Les dermatites allergiques

Les dermatites allergiques se manifestent par des démangeaisons parfois intenses et des symptômes cutanés variés et très désagréables pour nos compagnons : **croûtes, plaques rouges suintantes, perte de poils**. Les allergènes impliqués sont variés: piqûres d'insectes (puces), acariens de la poussière de maison, certains pollens et aliments. Deux types d'allergies sont fréquemment rencontrées pendant la période estivale :

La dermatite allergique aux piqûres de puces (DAPP)

C'est l'affection allergique la plus fréquente chez le chien et le chat. Les substances allergisantes sont contenues dans la salive de l'insecte. Seules quelques piqûres suffisent et l'animal sensibilisé l'est pour toute sa vie. Les **démangeaisons** sont **intenses** et sont accompagnées de croûtes et de dépilations sur le dos, les **lombes** et à la **base de la queue**. Le diagnostic de la DAPP n'est pas toujours aisé, car les puces, souvent en faible nombre, ne sont pas toujours décelables sur l'animal. Le traitement consiste à **éliminer les puces** le plus rapidement possible, sur l'animal et dans l'environnement. Un traitement à base de corticoïdes ou des antibiotiques sont parfois prescrits.



Dermatite allergique aux piqûres de puces

La dermatite atopique canine

Elle débute généralement entre 6 mois et 3 ans et se caractérise par des démangeaisons au niveau des **membres** et de la **face**. Il existe une



Dermatite atopique : la couleur brune du poil est due au léchage

prédisposition génétique et familiale. Les races communément citées sont le Fox Terrier, le Jack Russel Terrier, le Westie, le Labrador et le bouledogue français, mais la liste n'est pas limitative. Les allergènes responsables sont principalement les **pollens d'arbres, de graminées ou d'herbacées**, mais aussi les acariens de la poussière (dans ce dernier cas, les démangeaisons persistent toute l'année). On observe une coloration brunâtre des poils due au léchage, ainsi que des dépilations, des excoriations et une hyperpigmentation de la peau lorsque l'affection devient chronique. Le diagnostic repose sur l'historique et l'identification des allergènes grâce à des tests d'intradermoréaction ou par un test sanguin. Le traitement vise à contrôler les infections secondaires et les démangeaisons. Une **désensibilisation spécifique** peut donner des résultats intéressants.

Les symptômes de la douleur

Posture et attitude générale	- modification d'activité : léthargique ou à l'inverse hyperactif - posture anormale, chat : couché sur le ventre
Locomotion	- raideur, difficulté à se lever, boiterie, refus de se déplacer - tourne en rond sans repos
Cris ou pleurs anormaux	- sans raison ou à l'approche de personnes - hurlements, gémissements - souvent calmées par les caresses chez le chien - chat qui crache si on l'approche ou on le touche
Apparence	- chat sale qui ne fait plus sa toilette
Appétit	- diminué ou absent
Comportement	- prostration, agressivité, indifférence
Expression faciale	- stupeur, yeux dans le vide, pupilles dilatées - chat : yeux mic-clos
Manipulation	- retrait du membre concerné, agressivité, parfois avant d'être touché - léchage, morsure ou auto-mutilation des zones douloureuses