



Horaires d'ouverture

Consultations sur rendez-vous

Lundi - vendredi : 9h⁰⁰ - 12h⁰⁰
Samedi : 9h⁰⁰ - 13h⁰⁰

Consultations libres

Lundi - vendredi : 14h⁰⁰ - 19h⁰⁰

Tél : 05 63 58 39 70

veterinaire.saintroch@gmail.com

Les coulisses de la clinique

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous présenter les nouvelles de l'automne.

Rosalie qui vous accueille à la clinique poursuit sa formation en alternance pour sa 2^{ème} année, en vue d'obtenir le diplôme d'Assistante Spécialisée Vétérinaire.

Elle sera donc ponctuellement absente et nous vous prions de nous excuser pour l'éventuelle attente que cela occasionnerait.



Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance au mois d'août de la petite Chloé du Docteur Bérengère Wambergue. Elle sera de retour parmi nous au début de l'année 2014.

Bonne lecture.

La mutuelle animale

Votre animal, même jeune, n'est pas à l'abri d'une maladie ou d'un accident qui peut engendrer des frais imprévus et souvent coûteux. Une mutuelle qui rembourse vos soins vétérinaires vous permet de faire face à ces dépenses immédiatement.

Les urgences chez le chien et le chat - 1^{ère} partie

Mon chien saigne, mon chat boite... pas toujours facile de déterminer s'il faut consulter rapidement ou si au contraire, ça peut attendre ! Voici trois exemples de situations réellement urgentes auxquelles vous pourriez être confrontés.

L'accident de la voie publique et la défenestration

Les blessures peuvent aller de la simple entorse jusqu'à l'hémorragie interne ou la paralysie des membres. Malheureusement, les blessures les plus graves ne sont pas forcément les plus visibles. En effet, un chien peut se relever d'un choc avec une voiture, mais avoir les organes abdominaux atteints (rupture de la vessie p.ex.). Lors d'un choc, évitez au maximum de manipuler ou de déplacer votre animal. Portez-le sur un drap qui fera office de civière. Essayez d'arrêter tout saignement visible en appuyant sur la plaie avec une compresse ou un linge propre. Consultez immédiatement dans tous les cas.

Les défenestrations sont fréquentes chez les chats en ville. Les blessures les plus rencontrées sont les fractures, mais aussi les hémorragies internes, les ruptures diaphragmatiques et les pneumothorax (de l'air autour du poumon, qui empêche le chat de respirer). Là aussi, il vaut mieux consulter, même si votre chat ne semble pas être blessé.

Le syndrome urologique félin

Le chat mâle peut, de part l'anatomie de ses voies urinaires, être victime d'une obstruction de l'urètre par un bouchon de calculs, de cristaux, de mucus ou un caillot. Il se retrouve alors dans l'impossibilité d'uriner, avec des conséquences souvent graves pour les reins. De manière très

caractéristique, il se met souvent en position pour uriner, sans y parvenir. Il est fréquent de voir des petites gouttes d'urine teintées de sang dans la litière ou même à travers l'habitation. Il est important de ne pas confondre ces symptômes avec ceux d'une constipation, car une intervention précoce par le vétérinaire est impératif (le jour même, n'attendez pas). Une sonde urinaire doit être placée sous anesthésie générale, afin de repousser le bouchon et de vidanger la vessie. Une alimentation de mauvaise qualité constitue une des causes principales, ainsi que la tendance du chat à boire peu de façon naturelle.

Les convulsions

Lors d'une crise convulsive, tous les muscles se contractent en même temps, l'animal perd connaissance et peut aussi vocaliser, saliver, uriner, déféquer. Généralement, les convulsions ne durent que quelques secondes à quelques minutes. L'animal se réveille ensuite, mais peut rester déboussolé quelques minutes à quelques heures avec des difficultés à reconnaître son entourage, se déplacer etc.



Que pouvez-vous faire en cas de crise convulsive ? Dans tous les cas, il est souhaitable de ne pas stimuler votre compagnon. Le secouer, l'appeler, bref le stimuler prolonge généralement la phase convulsive de la crise. N'essayez pas d'attraper la langue ! Un animal ne peut pas l'avaler et vous risquez de vous faire mordre. Laissez votre animal au calme pendant et après la crise car il peut être agressif et peut ne pas vous reconnaître. La situation n'est dangereuse pour l'animal que si les crises se suivent de façon rapprochée ou si la crise dure trop longtemps (plus que quelques minutes), il est alors essentiel de voir un vétérinaire en urgence afin qu'il administre des anti-convulsivants en intraveineux.

L'arrivée d'un nouveau compagnon à la maison



Vous y avez réfléchi à deux fois, toute la famille est d'accord : vous voilà prêt à accueillir un chien ou un chat chez vous. Si c'est votre premier animal, ce petit pense-bête devrait vous aider à vous organiser pour ses soins de santé.

Leptospirose, maladie de carré, hépatite et parvovirose	Généralement 1 ^{er} vaccin vers l'âge de 8 semaines et rappel à 12 semaines
La rage	Pour quitter le territoire avec votre animal; âge minimum: 12 semaines; une seule injection suffit
Vermifugation	Minimum tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois, ensuite tous les 3 mois
Le traitement antipuce	Des produits antipuce efficaces existent, même pour les animaux très jeunes, n'hésitez pas à nous demander conseil !
L'examen vétérinaire	Se fait en général lors de la vaccination; votre animal sera examiné sous toutes ses coutures
Autres vaccins : leishmaniose, piroplasmose, borrelie	Administrés après l'âge de 6 mois, car ils ne peuvent pas être administrés avec les autres vaccins
L'alimentation	Choisissez des croquettes de bonne qualité et laissez-nous vous guider dans votre choix.

Pourquoi faire stériliser son lapin ?

La fertilité du lapin est légendaire. Lorsque l'on possède un couple de lapins, la question de la stérilisation se pose donc tout naturellement. En revanche, lorsque le lapin est célibataire, rares sont les propriétaires de lapins qui songent à la stérilisation. Pourtant, celle-ci est bénéfique.

Éviter la surpopulation

De nombreux lapins sont abandonnés chaque semaine et certains attendent plus d'un an dans un refuge avant d'être adoptés. Si vous avez un couple de lapins, nous vous conseillons donc de les faire stériliser tous les deux afin de leur permettre une vie harmonieuse sans harcèlement, ni lutte, ni reproduction. Le lapin est un animal social, auquel la présence d'un congénère de sexe opposé apporte sérénité, distraction et équilibre.

Santé de la femelle

Le risque de tumeur utérine ou ovarienne peut atteindre 80% chez la lapine de plus de 5 ans non stérilisée. La stérilisation permet

d'assurer une longévité égale à celle des mâles (8-10 ans) et se pratique idéalement entre 6 mois et 1 an.

Santé du mâle

La castration permet au mâle de vivre sa vie plus sereinement et de cohabiter avec une compagne. Une mâle non opéré marque beaucoup son territoire (jets d'urine et crottes), ce qui rend sa vie en liberté ou semi-liberté quasi impossible.

Amélioration du bien-être

Le lapin subit à l'état sauvage une forte pression hormonale qui le pousse à s'accoupler et à défendre son territoire. L'agressivité, généralement liée à la défense du territoire, est souvent source d'incompréhension de la part du propriétaire. Ce comportement n'est plus nécessaire à sa survie lorsque le lapin vit en captivité et disparaît avec la stérilisation.



Qu'est-ce que la piroplasmose, Docteur ?

Il s'agit d'une maladie grave provoquée par un parasite du sang (*Babesia spp.*). Chez le chien, le parasite infecte les globules rouges et s'y multiplie, les détruisant et provoquant ainsi une anémie importante et un retard de la coagulation sanguine. C'est une affection mortelle si elle n'est pas traitée à temps.


Mon chat est-il à risque ?

Non, elle ne se transmet pas aux chats.

Où et comment mon chien peut-il l'attraper ?

Le Sud-Ouest et la périphérie du Massif Central sont les régions de France les plus touchées par la piroplasmose, mais les foyers peuvent se déplacer d'une année à l'autre.

Le parasite est transmis par une morsure de tique. La



tique doit rester accrochée et se nourrir en moyenne 3 jours avant d'infecter le chien.

Les symptômes ?

Assez brutalement, le chien présente un abattement prononcé, ne mange plus, est très fatigué et présente une forte fièvre. Les urines peuvent devenir marron foncé (couleur thé ou café). Les gencives et les conjonctives peuvent apparaître pâles une fois l'anémie installée.

Existe-t-il un traitement ?

La prise en charge par votre vétérinaire doit être la plus précoce possible (le jour même). Une injection sera administrée à votre chien pour supprimer au plus vite le parasite. La deuxième partie du traitement consiste à soigner l'anémie et l'insuffisance rénale. Chez les animaux les plus atteints, une transfusion sanguine peut s'avérer nécessaire. Il

est particulièrement difficile de lutter contre des séquelles graves comme l'insuffisance rénale.

La prévention ?

Il existe deux méthodes essentielles et complémentaires pour protéger votre chien contre les maladies transmises par les tiques.

- Vous pouvez faire vacciner votre chien contre la piroplasmose dès l'âge de 6 mois.
- Protégez votre chien contre les tiques. Il existe des produits antiparasitaires externes sous forme de pipettes à appliquer tous les mois ou d'un collier actif pendant plusieurs mois.

Vérifiez le pelage de votre compagnon après chaque sortie. Si vous pouvez retirer les tiques dans la journée de leur fixation, cela aide à prévenir la transmission de maladies.

